

BIOHUI®

博晖生物

核准日期：2006年03月02日

人免疫球蛋白说明书

本品不供孕

请仔细阅读说明书并在医师

传播的可能。临床使用时应权衡利弊。

【药品名称】

通用名称：人免疫球蛋白

英文名称：

汉语拼音：

【规格】

300mg/瓶 (10%, 3ml)

【用法用量】

用法：肌肉注射或静脉注射。

用量：遵医嘱。

预防麻疹：为预防发病或减轻症状，可在与麻疹患者

密切接触后，于72小时内注射本品，成人每次0.5-1.0ml，

儿童每次0.1-0.2ml，6岁以上儿童每次0.2-0.5ml。

治疗：每次注射预防效果通常为2-4周。

本品系由健康人血浆

经分离纯化而得。

本品未加防腐剂。

本品不含任何动物

源性成分。

本品不含任何

抗生素或黄色液体，可带乳光，不出现

沉淀。

本品不含任何

防腐剂。

【成份】

主要成份为人免疫球蛋白。

本品不含任何

防腐剂。

本品不含任何

动物源性成分。

本品不含任何

防腐剂。

【不良反应】

尚待积累更多不良反应的监测资料。少数人会出现

过敏反应，如皮疹、荨麻疹、发热、寒战、头痛、

【禁忌】

于抗体与抗原相互作用起到直接中和毒素与杀灭细

看IgA抗体的选择将IgA除去

感染有一定的作用。

【注意事项】

毒理研究：尚不清楚。

3. 运输及贮存过程中严禁冻结。

【贮藏】

于2~8℃避光保存和运输。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的

【包装】

《中国药典》2025年版三部和YB S00252013

未专门进行该项针对性试验研究

【批准文号】

国药准字S20063021 150mg/瓶

【参 考 文 献】

【药物相互作用】

相互作用的药物可

国药准字S20063020 150mg/瓶

应单独使用。凡对免疫球蛋白有相
能会对本品产生相互作用。

【药品上市许可持有人】

博晖生物制药(河北)有限公司

【药物过量】

剂量大在注射部位造成疼

【生产企业】

企业名称：博晖生物制药(河北)有限公司

可能产生变异反应和因
痛感。

生产地址：石家庄鹿泉绿岛火炬开发区晋山路6号

【药理毒理】

白内含有的大量抗体输给受者，使之

电话号码：0311-83935518

是把免疫球蛋

从低或无免疫状态很快达到暂时免疫保护状态。由